

Tippude värvimine

12. detsember 2002

Graafi $G = (V, E)$ (tippude) (korrektne) värvimisviis k värviga on mingi funktsioon $c : V \rightarrow \{1, \dots, k\}$, nii et

- Iga $e \in E$ jaoks, kus $\mathcal{E}(e) = \{u, v\}$, kehtib $c(u) \neq c(v)$.

S.t. serva otstipud on värvitud erinevad värviga.

Graaf G on värvitav k värviga, kui tal leidub tippude värvimisviis k värviga.

Graafi G kromaatiline arv (tippude järgi) on minimaalne selline k , mille korral G on värvitav k värviga. Tähistame $\chi(G)$.

Graafe, mis on värvitavad k värviga, nimetatakse ka k -aluselisteks.

$\Delta(G)$ tähistab graafi G tippude max. astet.

Teoreem. Silmusteta graaf $G = (V, E)$ on värvitav $\Delta(G) + 1$ värviga.

Tõestus. Induktsioon üle tippude arvu.

Baas. $|V| = 1$. Ilmne.

Samm. $|V| > 1$. Olgu $v \in V$. Induktsiooni eelduse kohaselt on $G \setminus v$ värvitav $\Delta(G \setminus v) + 1$ värviga. Ta on värvitav ka $\Delta(G) + 1$ värviga, sest $\Delta(G) \geq \Delta(G \setminus v)$.

Olgu c graafi $G \setminus v$ värvimisviis $\Delta(G) + 1$ värviga. Leidub värv i , nii et ükski tipu v naabritest pole seda värti. Värvime tipu v täiendavalt värviga i . □

Teoreem (Brooks). Olgu $G = (V, E)$ silmusteta graaf. Olgu $d \geq \max\{\Delta(G), 3\}$. Kui G -s pole $(d + 1)$ -elemendilist klikki, siis on G värvitav d värviga.

Tõestame selle tulemuse loengu lõpus.

Teoreem. Tasandiline lihtgraaf $G = (V, E)$ on värvitav kuue värviga.

Tõestus. Induktsioon üle tippude arvu.

Baas. $|V| = 1$. Ilmne.

Samm. $|V| > 1$. Olgu $v \in V$ selline, et $\deg(v) \leq 5$, selline v leidub G tasandilisuse tõttu. Induktsiooni eelduse kohaselt on $G \setminus v$ värvitav kuue värviga.

Olgu c graafi $G \setminus v$ värvimisviis kuue värviga. Leidub värv i , nii et ükski tipu v naabritest pole seda värvit. Värvime tipu v täiendavalt värviga i . □

Teoreem. Tasandiline lihtgraaf $G = (V, E)$ on värvitav viie värviga.



Tõestus. Induktsioon üle tippude arvu.

Baas. $|V| = 1$. Ilmne.

Samm. $|V| > 1$. Olgu $v \in V$ selline, et $\deg(v) \leq 5$. Kui $\deg(v) \leq 4$, siis järeldub G värvitavus viie värviga $G \setminus v$ värvitavusest viie värviga. See järeldumine on analoogiline kahe eelmise tõestusega.

Olgu $\deg(v) = 5$. Olgu $N(v) = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$.

Serva *kokkutõmbamise* operatsioon ($G \Rightarrow G'$):





Graafi G' tähistame G/e .

Leiduvad $v_i, v_j \in \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$, mis pole naabertipud.


Muidu oleks $K_5 \leq G$, seega poleks G tasandiline.

Olgu $G' = (G/(v, v_i))/(v, v_j)$.


G' näeb välja nagu G , ainult et tippude v, v_i, v_j asemel on üksainus tipp w .




G' -le rakendame induktsiooni eeldust. Olgu c graafi G' värvinisviis viie värviga.



Graafi G tippudest värvime v_i ja v_j sama värviga kui $w\dots$



ja v värvime värviga, mida ükski tema naabertipp ei ole.



Olgu $G = (V, E)$ mingi graaf. Mitmel eri viisil on teda võimalik k värviga värvida?

S.t. kui palju leidub funktsioone $c : V \rightarrow \{1, \dots, k\}$, mis on G tippude korrektsed värvimisviisid k värviga?

S.t., kui

- c on G värvimisviis k värviga;
- $\sigma : V \rightarrow V$ on G mingi automorfism;
- $\varphi : \{1, \dots, k\} \rightarrow \{1, \dots, k\}$ on mingi bijektsioon,

siis c , $c \circ \sigma$ ja $\varphi \circ c$ loeme kõik erinevateks.

Värvimisviiside arvu tähistame sümboliga $P_G(k)$.

Kehtivad:

$$\mathrm{P}_{O_n}(k) = k^n$$

$$\mathrm{P}_{K_n}(k) = k(k-1)(k-2)\cdots(k-n+1)$$

kui T on n -tipuline puu, siis

$$\mathrm{P}_T(k) = k(k-1)^{n-1} .$$

Teoreem. Olgu $G = (V, E)$ lihtgraaf. Olgu $e \in E$. Siis $P_G(k) = P_{G-e}(k) + P_{G/e}(k)$.

Tõestus. Olgu $u, v \in V$ serva e otstipud.

- Graafil $G - e$ on värvimisviise c , kus $c(u) \neq c(v)$, sama palju, kui graafil G on värvimisviise.
- Graafil $G - e$ on värvimisviise c , kus $c(u) = c(v)$, sama palju, kui graafil G/e on värvimisviise.

Seega $P_{G-e}(k) = P_G(k) + P_{G/e}(k)$. □

Järeldus. P_G on polünoom.

Tõestus. Induktsioon üle servade arvu.

Baas. $G = O_n$. Siis $P_G(k) = k^n$.

Samm. G -s on servi. Olgu e graafi G mõni serv. Siis $P_G(k) = P_{G-e}(k) - P_{G/e}(k)$. Induktsiooni eelduse järgi on P_{G-e} ja $P_{G/e}$ polünoomid, seega on P_G kahe polünoomi vahe, s.t. polünoom. \square

Funktsiooni P_G nimetatakse graafi G *kromaatiliseks polünoomiks*.

Mingi graafi kromaatilist polünoomi saab leida viimase teoreemi abil.

Olgu G n tipu ja m servaga lihtgraaf. Olgu G_1, \dots, G_t tema sidususkomponendid. Siis

- $P_G(k)$ on n -nda astme polünoom.
- k^n kordaja $P_G(k)$ -s on 1.
- k^{n-1} kordaja $P_G(k)$ -s on $-m$.
- $P_G(k)$ kordajad on vahelduvate märkidega.
- $P_G(k) = \prod_{i=1}^t P_{G_i}(k)$.
- Kui G on sidus, siis $P_G(k)$ vabaliige on null ja lineaarliige on nullist erinev.

Tõestus (enamasti) induktsiooniga üle servade arvu, kasutades viimast teoreemi ning (baasina) seda, et $P_{O_n}(k) = k^n$.

Kodune ülesanne.


Teoreem (Brooks). Olgu $G = (V, E)$ silmusteta graaf. Olgu $d \geq \max\{\Delta(G), 3\}$. Kui G -s pole $(d + 1)$ -elemendilist klikki, siis on G värvitav d värviga.

Tõestus. Oletame, et teoreemi väide ei kehti, olgu $G = (V, E)$ minimaalse tippude arvuga kontranäide. S.t.

- $\Delta(G) = d \geq 3$;
- G ükski sidususkomponent ei ole K_{d+1} ;
- $\chi(G) > \Delta(G)$.


Olgu $v \in V$ mingi tipp. Olgu $H = G \setminus v$. Olgu c H -i mingi värvimisviis d värviga.

v -l on d naabertippi ja neil kõigil on erinev värv. Olgu $N(v) = \{v_1, \dots, v_d\}$, nii et $c(v_i) = i$.




Teoreemi tõestuseks piisab näidata, et leidub H -i värvimisviis c' , mis annab kahele v naabertipule sama värtvi.

Olgu i ja j kaks värv ja olgu H_{ij} graafi H indutseeritud alamgraaf, mille moodustavad kõik need tipud, mis on värvitud värviga i või j .




Kui me H_{ij} mõnes sidususkomponendis värvid ära vahetame, siis saame jälle korrektse värvimisviisi.



Seega peavad v_i ja v_j asuma H_{ij} samas sidususkomponendis.


Tähistame seda sidususkomponenti C_{ij} -ga.




Järgmisena näitame, et C_{ij} peab olema ahel otspunktidega v_i ja v_j .

Piisab, kui näitame, et muidu leiduks H -i värvimisviis c' , mille korral indutseeritud alamgraafis H'_{ij} oleksid v_i ja v_j erinevates sidususkomponentides.

Tipu v_j aste graafis H on $\leq d-1$. Kui v_j kaks naabrit oleksid sama värtvi, siis oleks v_j naabritel ülimalt $d-2$ erinevat värtvi.




Seega saab tipu v_j värvit valida vähemalt kahel eri viisil. Üks neist on j , aga leidub ka mõni teine.



Nüüd on kahel tipul hulgast $\{v_1, \dots, v_d\}$ sama värv.


$$\text{Seega } \deg_{C_{ij}}(v_j) = 1.$$

Vaatame mingit teed v_j -st v_i -sse. Olgu z esimene tipp sel teel, mille aste C_{ij} -s on ≥ 3 .



z -i naabrite hulgas esineb $\leq d - 2$ erinevat värvit (kuni d naabrit, neist vähemalt kolmel sama värv).


z-i värv saab valida kahel viisil. Üks neist on *i* või *j*, aga leidub ka teine.



Siis C_{ij} laguneb kaheks (või enamaks) komponendiks, seejuures v_i ja v_j jäädavad erinevatesse komponentidesse.

Järelikult on C_{ij} ahel.

Järgmisena näitame, et ahelad C_{ij} ja C_{jk} lõikuvad ainult tipus v_j .




Vastasel korral oleks ühise tipu naabritel jälle ülimalt $d - 2$ erinevat värti ja selle tipu saaks ümber värvida.

Seega:


- Iga kahe tipu v_i ja v_j jaoks leidub täpselt üks lihtahel C_{ij} tipust v_i tippu v_j , kus tipud on vaheldumisi värvil i ja j .
 - Kui v_i ja v_j on servaga ühendatud, siis see serv ongi selleks lihtahelaks.
- Need lihtahelad ei lõiku üksteisega mujal kui oma ots-tippudes.

Leiduvad mingid tipud v_i ja v_j , mis pole omavahel servaga ühendatud (sest G -s polnud $(d + 1)$ -elemendilist klikki).

Olgu w tipu v_j naaber, mis on värvि i .



Graafis C_{jk} vahetame värvaid j ja k . Saame uue värvimisviisi c' ja uued ahelad C'_{ij} .



Aga nüüd kuulub w nii C'_{ij} -le kui ka C'_{ik} -le. Me näitasime ennem, et see viib vastuoluni. \square