

Algoritmid maksimaalse kooskõla ja
minimaalse hinnaga täieliku kooskõla
leidmiseks

Maksimaalse kooskõla leidmiseks graafis $G = (V, E)$ alustame lihtsalt mingist kooskõlast M .

Järgnevas anname algoritmi, mille abil konstrueerida kooskõla M' , kus on ühe võrra rohkem servi.

(kui selline M' leidub)

M võib olla \emptyset , võib ka olla ahne algoritmiga koostatud:


- Olgu $M := \emptyset$.
- Iga $e \in E$ jaoks
 - kui M ei kata e kumbagi otstippu, siis lisa e hulka M .

Kooskõla M suurendamiseks tuleb meil leida M -laienev tee.

Selle hõlbustamiseks defineerime suunatud graafi \overrightarrow{G}_M :


$$V(\overrightarrow{G}_M) = V$$

$$E(\overrightarrow{G}_M) = \{(u, w) \mid \exists v \in V : (u, v) \in E \setminus M, (v, w) \in M\} .$$



Kui $\deg_M(u) = \deg_M(v) = 0$, siis G -s leidub M -laienev *mitte tingimata lihtne* (MTL) tee u -st v -sse parajasti siis, kui \overrightarrow{G}_M -s leidub (suunatud) ahel u -st $N(v)$ -sse.
 (... s.t. mingisse tippu $w \in N(v)$)

M -laienev mittelihtne tee u -st v -sse:



Olgu $W \subseteq V$ kõigi selliste tippude hulk, mida M ei kata.


Lemma. Olgu $P = v_0 - v_1 - \dots - v_m$ minimaalse pikkusega M -vahelduv MTL tee W -st (s.t. $v_0 \in W$) mingisse tippu $v = v_m$. Siis kehtib üks järgmistest väidetest:

- P on lihtne.
- P ei ole lihtne, leiduvad sellised i, j , et
 - (i) $0 \leq i < j \leq m$;
 - (ii) $v_i = v_j$;
 - (iii) i on paaris, j on paaritu;
 - s.t. servad $v_i - v_{i+1}$ ja $v_{j-1} - v_j$ ei kuulu M -i;
 - (iv) v_0, \dots, v_{j-1} on kõik erinevad.

Tõestus. Kui P on lihtne, siis pole midagi tõestada.


Oletame, et P ei ole lihtne, olgu $j \in \{1, \dots, m\}$ vähim selline, et leidub $i < j$ nii, et $v_i = v_j$. Selline i ja j valik rahuldab triviaalselt tingimusi (i), (ii), ja (iv).

Kui $j - i$ oleks paaris, siis...



poleks P minimaalse pikkusega.



Kui j oleks paaris (ja i paaritu), siis...



oleks juba v_{j-1} mingi varasema tipuga võrdne (v_{i+1} -ga). \square



Olgu $G = (V, E)$ mingi lihtgraaf ja olgu $U \subseteq V$. Tipuhulga U *kokkutõmbamine* G -s annab lihtgraafi G/U , kus

- kõik U -sse kuuluvad tipud on kustutatud, nende asemel on graafi lisatud üks uus tipp u ;
- u on ühendatud kõigi tippudega $N_G(U) \setminus U$ -st.




Defineerime veel:

- Kui $H \leq G$, siis $G/H = G/V(H)$.
- Kui $M \subseteq E(G)$ ja $U \subseteq V(G)$, siis M/U on graafi $(V(G), M)/U$ servade hulk.




Olgu $G = (V, E)$ ja olgu M mingi kooskõla G -s. Tsükkel $C \subseteq G$ on M -õis, kui

- $|C| = 2k + 1$ mingi $k \in \mathbb{N}$ jaoks;
- $|C \cap M| = k$.
- C sisaldab tippu, mida M ei kata.



Teoreem. Olgu $G = (V, E)$ ja olgu M mingi kooskõla G -s. Olgu C mingi M -õis. Siis M on maksimaalne kooskõla G -s parajasti siis, kui M/C on maksimaalne kooskõla G/C -s.


Tõestus. Olgu $c \in V(G/C)$ tipp, milleks C kokku tõmmati. Paneme tähele, et kui C on M -õis, siis M/C ei kata c -d, sest ükski M -i kuuluv serv pole C -sse kuuluva ja mittekuuluva tipu vahel.



Tõestame pöördvastandteoreemi.


M pole maksimaalne $\Rightarrow M/C$ pole maksimaalne.

Olgu P M -laienev tee graafis G . Kui P ei sisalda C tippe, siis on ta ka M/C -laienev tee G/C -s.



Kui P sisaldab C tippe, siis vähemalt üks tema otstippudest ei kuulu C -sse (sest C -s on üksainus M -i poolt katmata tipp).



Olgu Q P alamahel tema C -s mitteolevast otstipust kuni esimese C -s oleva tipuni. Siis Q on M/C -laienev G/C -s.






M/C pole maksimaalne $\Rightarrow M$ pole maksimaalne.

Olgu P M/C -lainenev tee graafis G/C . Kui ta ei sisalda tippu c (milleks C kokku tõmmati), siis on ta ka M -lainenev G -s.

Kui P sisaldab c -d, siis on c üks tema otstippudest. Olgu v tipu c naabertipp P -l ja olgu u P teine otstipp.



M -laieneva tee graafis G saame, liikudes tipust u mööda teed P tippu v , sealt mõnele tsükli C asuvale tipule ja edasi mööda tsükli M -i poolt katmata tipuni. \square



Algoritm kooskõla M graafis G suurendamiseks ühe serva võrra (kui M pole veel maksimaalne):

1. Leia lühim M -vahelduv MTL tee P W -st W -sse.

- Leia lühim suunatud tee W -st $N(W)$ -sse graafis \overrightarrow{G}_M .


- See leitakse \overrightarrow{G}_M -i laiuti läbides.

2. Kui sellist P -d ei leidunud, siis ei leidu ka M -laienevaid teid. Tagasta „ M on maksimaalne“.


3. Kui P on lihtne, siis on ta M -laienev tee. Tagasta $M \triangle E(P)$.

- \triangle — sümmeetriline vahe.

4. Kui $P = v_0 - v_1 - \dots - v_m$ pole lihtne, siis olgu j vähim selline, et leidub $i < j$ nii, et $v_i = v_j$.




5. Olgu $M := M \Delta \{v_0 - v_1, v_1 - v_2, \dots, v_{i-1} - v_i\}$.



Siis M on ikka kooskõla (suurenes ainult $\deg_M(v_0)$, mis ennem oli 0) ja $C = v_i - v_{i+1} - \dots - v_j$ on M -õis.

6. Kutsu algoritm rekursiivselt välja M/C ja G/C jaoks.
7. Kui M/C oli maksimaalne, tagasta „ M on maksimaalne“.
8. Kui tagastati kooskõla N , siis
 - Kui N ei kata tippu c , milleks C kokku tõmmati, siis tagasta $(N \cap E(G \setminus C)) \cup (M \cap E(C))$.

- Kui N katab tippu c , siis olgu v tipu c paariline N järgi ning $w \in V(C)$ mingi tipu v naabertipp graafis G . Tagasta $(N \cap E(G \setminus C)) \cup \{v - w\} \cup M_C^w$, kus M_C^w on maksimaalne kooskõla $C-1$, mis w katmata jätab.




Keerukus:

- Maksimaalse kooskõla leidmiseks tuleb eelnevat algoritmi välja kutsuda kuni $|V|/2$ korda.
- Ühel väljakutsel:
 - Tee P on leitav ajas $O(|E|)$. Samuti on M -i parandamine tehtav ajas $O(|E|)$.
 - Rekursiooni sügavus on $O(|V|)$.

Kokku kulub aega $O(|V| \cdot |E|)$.


- Maksimaalne kooskõla on leitav ajas $O(|V|^2 \cdot |E|)$.

G M W $N(W)$




G M W $N(W)$

Lühim M -laienev MTL tee




G M W $N(W)$

$M-\tilde{0}is$




G/C M/C W $N(W)$




G M W $N(W)$

Lühim M -laienev MTL tee



G M W $N(W)$


Lühim M -laienev MTL tee
tsükkel M -laieneval teel




G M W $N(W)$

Lühim M -laienev MTL tee

M -õis




G/C M/C W $N(W)$




G M W $N(W)$

Lühim M -laienev MTL tee




G M W $N(W)$

M - \tilde{o} is




G/C M/C W $N(W)$




G M W $N(W)$

M - \tilde{o} is




G/C M/C W $N(W)$




G M W $N(W)$


Lühim M -laienev tee




G M




G M




G M




G M




G M




G M




G M



G M



G M




Vaatame nüüd järgmist ülesannet:

Antud graaf $G = (V, E)$ ja servade kaalud $w : E \rightarrow \mathbb{R}$.
Leida selline täielik kooskõla M , et $\sum_{e \in M} w(e)$ oleks minimaalne võimalik.

Eeldame, et G -s leidub täielik kooskõla.

Eeldame, et iga $e \in E$ jaoks $w(e) \geq 0$. Kui nii ei ole, siis liidame kõigi servade kaaludele mingi küllalt suure konstanti c . Sellega suurenevad kõigi täielike kooskõlade kaalud $c|V|/2$ võrra, s.t. minimaalse kaaluga täielikud kooskõlad jäävad samaks.


Olgu $G = (V, E)$ ja M kooskõla G -l. Siis $T \leq G$ on *M-laienev puu*, kui T on juurega puu, mille juurt r_T M ei kata (aga kõiki teisi tippe katab), ja kõik juurest algavad lihtahelad T -s on M -vahelduvad.



Olgu

- $V^+(T) = \{v \in V(T) \mid d(r_T, v) \text{ on paaris}\};$
- $V^-(T) = \{v \in V(T) \mid d(r_T, v) \text{ on paaritu}\};$

$F \leq G$ on *M-laienev mets*, kui $V(F) = V$, $M \subseteq E(F)$ ja F -i iga sidususkomponent on kas M -laienev puu või M -i kuuluv serv.



$V^+(F)$ ja $V^-(F)$ olgu F -i kuuluvate M -laienevate puude T vastavate hulkade ühendid.

Kui M ei kata v -d, siis $v \in V^+(F)$.

Tähistame:

- $\wp(X)$ on hulga X kõigi alamhulkade hulk.
- Olgu $G = (V, E)$ mingi graaf. Kui $U \subseteq V$, siis olgu $\delta(U) \subseteq E$ nende servade hulk, mille üks otstipp on U -s ja teine $V \setminus U$ -s.

Algoritm kasutab abistruktuurina paari (Ω, π) , kus $\Omega \subseteq \wp(V)$ ja $\pi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$. Nad rahuldavad järgmisi omadusi:

- Ω on alamhulkade *pesastatud* hulk.
- Ω kõik elemendid on paarituarvulise võimsusega.
- Kui $U \in \Omega$ ja $|U| \geq 3$, siis $\pi(U) \geq 0$.
- Iga $e \in E$ jaoks $\sum_{\substack{U \in \Omega \\ e \in \delta(U)}} \pi(U) \leq w(e)$.


Hulk $\Xi \subseteq \wp(X)$ on *pesastatud*, kui iga $Y, Z \in \Xi$ jaoks kas $Y \subseteq Z$, $Z \subseteq Y$ või $Y \cap Z = \emptyset$.

Näide: Kui $X = \{1, \dots, 5\}$, siis $\{\{1\}, \{4\}, \{2, 4\}, \{3, 5\}, \{1, 3, 5\}, \{1, 2, 3, 4, 5\}\}$ on pesastatud hulk.

Lause. Kui $\Xi \subseteq \wp(X)$ on pesastatud ja $\emptyset \notin \Xi$, siis $|\Xi| \leq 2^{|X|} - 1$.

Tõestus. Vaatame graafi T_{Ξ} , mille tippudeks on Ξ elemendid ning milles on kaar $Y \rightarrow Z$ parajasti siis, kui $Y \supset Z$ ning ei leidu sellist elementi $W \in \Xi$, et $Y \supset W \supset Z$.

Näide:




Siis T_{Ξ} on mets, tema igal sidususkomponendil on juur — suurim element selles komponendis.

Täiendame hulka Ξ (ja ka metsa T_Ξ) järgmiselt:

- Lisame elemendi X hulka Ξ (kui seda seal veel ei ole).
Siis T_Ξ -st saab puu juurega X .
- Iga $x \in X$ jaoks lisame $\{x\}$ hulka Ξ . Neist saavad puu T_Ξ lehed.
- Seni kuni mingil elemendil $Y \in \Xi$ on puus T_Ξ vähemalt kolm alluvat Z_1, \dots, Z_k , lisame Ξ -sse elemendi $Z_1 \cap Z_2$.

Need täiendused ei muuda Ξ -d mittepesastatuks.

Näide:



Nüüd on T_{Ξ} -s $|X|$ lehte ja iga sisemise tipu aste on 2. Kokku on tippe seega $2|X| - 1$. □

Algoritm kasutab hulka Ω , et meeles pidada, millised tsük-
lid on kokku tõmmatud.

Suvalise täieliku kooskõla $M \subseteq E$ jaoks kehtib

$$\begin{aligned}
 w(M) &= \sum_{e \in M} w(e) \geq \sum_{e \in M} \sum_{\substack{U \in \Omega \\ e \in \delta(U)}} \pi(U) = \\
 &\sum_{U \in \Omega} \sum_{\substack{e \in M \\ e \in \delta(U)}} \pi(U) = \sum_{U \in \Omega} \pi(U) \sum_{\substack{e \in M \\ e \in \delta(U)}} 1 = \\
 &\sum_{U \in \Omega} \pi(U) \cdot |M \cap \delta(U)| \geq \sum_{U \in \Omega} \pi(U) .
 \end{aligned}$$

Seega kui Ω , π ja M on sellised, et

- iga $e \in M$ jaoks $w(e) = \sum_{\substack{U \in \Omega \\ e \in \delta(U)}} \pi(U)$;
- iga $U \in \Omega$ jaoks $|M \cap \delta(U)| = 1$;

siis $w(M) = \sum_{U \in \Omega} \pi(U)$ ja seega M on minimaalse kaaluga täielik kooskõla.

Tähistame: $w_\pi(e) = \sum_{\substack{U \in \Omega \\ e \in \delta(U)}} \pi(U)$.

Algoritm peab töö käigus meeles ka senini leitud kooskõla M . Sinna kooskõlla võtab ta ainult selliseid servi e , mille jaoks $w(e) = w_\pi(e)$.

Kui $U \in \Omega$, siis olgu $\Omega[U] = \{U' \in \Omega \mid U' \subset U\}$.

G/Ω tähistagu graafi G , kus Ω kõik maksimaalsed elemendid on kokku tõmmatud.

Ω elemendid vastavad tsüklitele — kui $U \in \Omega$ ja $|U| \geq 3$, siis graafis $G[U]/\Omega[U]$ leidub Hamiltoni tsükkel sellistest servadest e , kus $w(e) = w_\pi(e)$.

(algoritm rahuldab sellist invarianti)

Min. hinnaga täieliku kooskõla leidmise algoritm on iteratiivne. Tema olek koosneb järgmistest osadest:

- Ω ;
 - iga $U \in \Omega$ jaoks, kus $|U| \geq 3$: eelmisel slaidil mainitud Hamiltoni tsükkel
- π , need rahuldavad eeltoodud omadusi;
- M — mingi kooskõla graafil G/Ω ;
- F — mingi M -laienev mets graafil G/Ω
 - M ja F kasutavad ainult selliseid servi e , kus $w(e) = w_\pi(e)$.

Algseis:

- $\Omega = \{\{v\} \mid v \in V\}$;
- $\pi(\{v\}) = 0$ iga $v \in V$ jaoks;
- $F = \emptyset$ (F kui servade hulk);
- $M = \emptyset$.

Itereerime seni, kuni M pole täielik kooskõla G/Ω -l.

Iteratsioon:...

Iga $e \in E$ jaoks olgu

- $\varepsilon_e = w(e) - w_\pi(e)$, kui e üks otstipp (graafis G/Ω) on $V^+(F)$ -s ja teine väljaspool $V^+(F) \cup V^-(F)$ -i;
- $\varepsilon_e = (w(e) - w_\pi(e))/2$, kui e mõlemad otstipud on $V^+(F)$ -s;
- $\varepsilon_e = \infty$ muudel juhtudel.

Leidub selline e , et $\varepsilon_e < \infty$, sest $|V^+(F)| > |V^-(F)|$ (nende vahe on võrdne tippude arvuga, mida M ei kata).

Olgu

$$\varepsilon = \min \left(\min_{e \in E} \varepsilon_e, \min_{U \in \Omega \cap V^-(F), |U| \geq 3} \pi(U) \right) .$$

Muudame π -d:

- Kui $U \in \Omega \cap V^+(F)$, siis $\pi(U) := \pi(U) + \varepsilon$.
- Kui $U \in \Omega \cap V^-(F)$, siis $\pi(U) := \pi(U) - \varepsilon$.

Kõik invariandid jäävad kehtima:

- $\pi(U) \geq 0$, kui $|U| \geq 3$;
- $w_\pi(e) \leq w(e)$;
- Hamiltoni tsükkel $G[U]/\Omega[U]$ -s...

ε oli maksimaalne, mis π sellisel muutmisel need invariantid kehtima jättis.


Peab leiduma vähemalt üks järgmistest objektidest:

- (i) $e \in E$, nii et $w_\pi(e) = w(e)$. Seejuures e mõni otstipp graafis G/Ω on $V^+(F)$ -s ja kumbki pole $V^-(F)$ -s.
- (ii) $U \in \Omega \cap V^-(F)$, $|U| \geq 3$, $\pi(U)=0$.

Juht (i). Lisa e metsale F .

- Kui e üks otstipp kuulus $V^+(F)$ -i ja teine ei kuulunud, siis F lihtsalt suurenes.
- Kui e mõlemad otstipud kuulusid $V^+(F)$ -i, siis e lisamine ühendas F -i kaks M -laienevast puust sidususkomponenti või tekitas ühes komponendis tsükli.
 - Kui ühendati kaks sidususkomponenti, siis tekkis M -laienev tee P . Defineeri $M := M \triangle P$ ja $F := M$.
 - Kui tekkis tsükkel U , siis lisa U Ω -sse, defineeri $\pi(U) := 0$, $M := M/U$, $F := F/U$. Edasi töötame graafiga G/U .


Juht (ii). Võta kokkutõmmatud tsükkel U tagasi lahti.




Eemalda U Ω -st, lisa M -i tsükli U servad nii, et kõik U tipud kaetud saaksid (kasutades servi e , kus $w(e) = w_\pi(e)$), lisa üks pool tsüklist F -i (nii, et $V^+(F)$ ja $V^-(F)$ väljaspool U -d ei muutuks), lisa tsükli teisest poolest F -i servad, mis kuuluvad M -i.

Kui oleme G/Ω -s jõudnud täieliku kooskõlani, siis võtame kokkutõmmatud tsüklid tagasi lahti.


- Tsüklid leiame Ω -st.
- Alustame Ω suurematest elementidest.






Ω π M F w w_π $V^?(F)$

Valime e vői U




Ω π M F w w_π $V^?(F)$


Saame M -laieneva tee




Ω π M F w w_π $V^?(F)$




Ω π M F w w_π $V^?(F)$




Ω π M F w w_π $V^?(F)$




Ω π M F w w_π $V^?(F)$




Ω π M F w w_π $V^?(F)$




Ω π M F w w_π $V^?(F)$




Ω π M F w w_π $V^?(F)$




Ω π M F w w_π $V^?(F)$




Ω π M F w w_π $V^?(F)$



Ω π M F w w_π $V^?(F)$




Ω π M F w w_π $V^?(F)$




Ω π M F w w_π $V^?(F)$


$$\varepsilon = 1/2$$




Ω π M F w w_π $V^?(F)$




Ω π M F w w_π $V^?(F)$



Ω π M F w w_π $V^?(F)$




Ω π M F w w_π $V^?(F)$




Ω π M F w w_π $V^?(F)$

$$\varepsilon = 1/2$$




Ω π M F w w_π $V^?(F)$




Ω π M F w w_π $V^?(F)$

$$\varepsilon = 1$$




Ω π M F w w_π $V^?(F)$




Ω π M F w w_π $V^?(F)$

$$\varepsilon = 1/2$$




Ω π M F w w_π $V^?(F)$




Ω π M F w w_π $V^?(F)$

$$\varepsilon = 1/2$$




Ω π M F w w_π $V^?(F)$


$$\varepsilon = 1/2$$




Ω π M F w w_π $V^?(F)$




Ω π M F w w_π $V^?(F)$



Ω π M F w w_π $V^?(F)$



Ω π M F w w_π $V^?(F)$




Ω

π

M

w




Ω

π

M

w




Ω

π

M

w




Ω

π

M

w



$$w(M) = 9$$

$$\sum_{U \in \Omega} \pi(U) = 9$$

Ω

π

M

w

Kui palju iteratsioone on?

Kui me oleme leidnud M -laieneva tee, siis $|V(G/\Omega)| - 2|M|$ väheneb kahe võrra. Kui me sellist teed ei leidnud (s.t. kasvatasime metsa või tõmbasime tsükli kokku), siis see suurus ei muutunud.

Seega leidub ülimalt $|V|/2$ iteratsiooni, kus leitakse M -laienev tee.

Olgu $W(F) \subseteq V$ kõigi nende tippude hulk, mis jäävad G/Ω -s mingi tipu $\in V^+(F)$ sisse. Olgu $V_0(F) = V(G/\Omega) \setminus V^+(F)$.

Igal iteratsioonil, kus M -laienevat teed ei leitud, suureneb avaldis $2|W(F)| + |V_0(F)|$.

- Kui kasvatati F -i, suureneb $|W(F)|$ vähemalt ühe võrra ning $|V_0(F)|$ väheneb ühe võrra.
- Kui tsükkel U tõmmati kokku, siis olgu $x \in V^-(F)$ -i kuuluvate tippude arv selles tsüklis. $|W(F)|$ suureneb vähemalt x võrra ja $|V_0(F)|$ väheneb x võrra.
- Kui tsükkel U võeti tagasi lahti, siis olgu $2x+1$ tippude arv selles tsüklis. $|W(F)|$ suureneb vähemalt x võrra ja $|V_0(F)|$ suureneb x võrra.

Avaldise $2|W(F)| + |V_0(F)|$ maksimaalne väärtus on $2|V|$.

Seega on iteratsioonid ülimalt $|V|^2$.